

ULV専用薬剤

医薬品

金鳥ULV乳剤E

水性乳剤

有効成分：ペルメトリン 5%
容 量：1ℓ・6ℓ・18ℓ

〈特 長〉

- ◎殺虫力にすぐれ、残効性に富んでいます。
- ◎フラッシング効果もあります。
- ◎ピレスロイド系水性乳剤ですので、安全性が高く、悪臭・汚染などもほとんどありません。

〈用 法・用 量〉

害虫の生息している場所に、原液のまま又は水で希釈し濃厚少量噴霧機で20ミクロン程度の薬液粒子にして空間噴霧してください。
噴霧後、室内を4～6時間、できれば一夜密閉してください。

適用害虫	使用希釈液	使 用 量	
		1㎡あたり	高さ2.5mとして 床面積1㎡あたり
ハエ成虫・蚊成虫・ ノミ・ゴキブリ・ トコジラミ(ナンキンムシ) イエダニ	原液	0.4～0.6ml	1～1.5ml
	2倍希釈液	0.8～1.2ml	2～3ml
	4倍希釈液	1.6～2.4ml	4～6ml

〈上手な使い方〉

- ◎戸棚・引出し・ロッカー・押入れ等を開放し、薬剤がよく行きわたるようにすると、より効果的です。
- ◎ULV施用は屋内の奥から入口に向かって順次行い、終了後は直ちに入口を閉め、室内を密閉状態に保ってください。
- ◎ベイト剤との併用時には、ベイト剤の喫食率を保つため、ベイト剤にはかからないように気をつけてください。



KINCHO


大日本除虫菊株式会社

〒550-0001 大阪市西区土佐堀1-4-11


☎06(6441)4783 第二営業部

フィールドテスト


(1.) 原液を1㎡あたり0.4mℓ(床面積1㎡あたり1mℓ)噴霧し、約3時間密閉する。
(75㎡の喫茶店)



(2.) 2倍希釈液を1㎡あたり0.8mℓ(床面積1㎡あたり2mℓ)噴霧し、一夜密閉する。
(50㎡の喫茶店)



防除機具と噴霧粒子径



使用上の注意

■ してはいけないこと

- ・ 薬剤を口や目に入れないで下さい。
- ・ 小分けしたり、水で希釈するときは、食品用の容器等、誤用の恐れのあるものを利用しないで下さい。
- ・ 希釈の際は、水がはね返らないように均一に攪拌し、直接手でかき混ぜるようなことはしないで下さい。希釈する容器は専用のものとし、他と兼用しないで下さい。

■ 相談すること

- ・ 万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに医師の診療を受けて下さい。薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清浄な空気の場所で安静にして、医師の診療を受けて下さい。医師の診療を受ける際には、本剤がピレスロイド系の殺虫剤であること、および使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師へ伝えて下さい。

■ 使用に際して、又は使用後の注意

- ・ 定められた用法、用量を厳守して下さい。間違った使い方をされた場合、生じた事故についての責任は負うことができません。
- ・ アレルギー症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、薬剤にふれたり作業に従事しないで下さい。
- ・ 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に移動させて下さい。
- ・ 使用目的以外の環境に影響を及ぼさないために乱用を避け、養魚池、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所、蜜蜂、蚕(桑)、水棲生物などに被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないで下さい。
- ・ 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、観賞魚、飼料、寝具、衣料等はあらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにして下さい。
- ・ 保護具を必ず着用し、身体の露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意して下さい。また、長時間の作業は避けて下さい。
- ・ 本剤は魚毒性が強いので屋内の水槽や屋外の河川、池等へ直接かかるような散布は避けるとともに、使用後残った希釈液や散布に用いた器材および使用済みの空容器を洗った液は、魚等が生息している場所に捨てないで下さい。
- ・ 使用に際しては、必要量だけを分取し、その都度使い切って下さい。
- ・ 適正な粒子を得るため、濃厚少量噴霧機の選択について十分にご留意下さい。