

シロアリ防除剤 土壌表面処理・発泡施工 防蟻ME剤

アリピレス® ME2

(公社)日本しろあり対策協会認定剤・(公社)日本木材保存協会認定剤

合成ピレスロイド剤

圧倒的な
バリア効果と
安全性で
守る。

新築
&
既築

発泡施工
土壌表面処理



- 安全性
- 非劇物 非危険物
- 低VOC 低臭性
- スパウトパウチ包装
- 残効性
- バリア効果

アリピレス® 普及会 FMC

®は登録商標です。

特徴

1. 殺蟻力&防蟻効果

- ・速効的な殺蟻効果があります。
- ・床下土壌へ有効成分の吸着性が高く、バリア効果が長期間続きます。

2. 優れた安全性

- ・本剤は(公社)日本しろあり対策協会、(公社)日本木材保存協会の認定を受けている薬剤であり、各種毒性試験で高い安全性が確認されております。
- ・揮散しにくい、臭気・刺激性が少なく、作業員や居住者に安全です。
- ・水溶解度が低いため、流亡しにくく、安全です。

3. 扱いやすい

- ・土壌表面処理および発泡施工の2つの処理方法があります。
- ・マイクロエマルジョン製剤なのでストレーナーやポンプの目詰まり、タンク内の沈澱が極めて少ないです。

組成・性状

組 成	ピフェントリン…… 2.0%	外 観	青色透明水溶性液体
比 重	1.048(20℃)	毒劇物区分	毒劇物に該当せず
使用濃度	0.05%	魚 毒	C 類相当
希釈倍数	40 倍		

使用方法

散布方法	希釈倍数	標準使用方法・使用量
土壌表面処理	40 倍	帯状散布 5 l / m ²
		面状散布 3 l / m ²
発泡施工	40 倍	2.5 ~ 2.6 l / m ² (床高 45 ~ 50cm) 発泡機「トルトル」により発泡倍率200~300倍で床下全体を泡で処理。

* 発泡施工には別途、ドルフォーム(起泡剤)が必要です。

ME剤

水に溶けない有効成分を界面活性剤で水に可溶化させた製剤のことであり、水希釈液は2週間安定している。本製品は青色に着色。

△使用上のご注意

- ・ご使用前に製品ラベルをご熟読いただき、用途以外にはご使用しないで下さい。
- ・ご使用にあたっては、安全チェックリストに従って点検、準備を実施し、安全性が確保された後に作業に入って下さい。
- ・魚介類に対する毒性が高いため、河川、湖沼、養魚池などの水系に流入の恐れがある場所での使用には十分ご注意ください。
- ・(社)日本しろあり対策協会の「防除施工標準仕様書並びに安全管理」および日本木材保存剤審査機関の「木材保存処理作業の安全指針」に従って作業を行って下さい。

包装 2.5kg×6 本入(1ケース)

アリピレス[®] 普及会

事務局 エフエムシー・ケミカルズ株式会社

農業製品事業部

〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3

TEL:03-3402-3736 FAX:03-3402-3700