

クマリン系殺そ剤 防除用医薬部外品

 **エンドックス®**

連続して少量ずつ摂取することによって
効果が蓄積し、致死効果が現れる
クマリン系ネズミ用ベイト剤

登録商標 第585249号

粉末なのでネズミが好む食べ物に
混ぜても使える

エンドックスは40年以上に亘って使用されているクマテトラリル抗血液凝固成分を使用したネズミ用ベイト剤。そのままでも、あるいはネズミの好む食材にまぶして現場に応じた処方もできます。



■ 有効成分

クマテトラリル...0.75%

■ 用法・用量

■ 粉のままの使い方

エンドックスをネズミの通路、かくれ場所に5~10cm幅に下地が見えない程度まいて下さい。また、ネズミの穴(出入口)、1穴に対して10g~30gを吹き込んで下さい。

散粉したエンドックスは少なくとも5日以上そのままの状態にしておき、もし少なくなっている場合はまたし

■ 簡単に効果のある毒餌のつくり方

準備するもの	一般家庭の基準量
殺そ剤 エンドックス	20g(茶さじ約5杯)
生のサツマイモを1cm角に切ったもの 乾燥したパン粉 天ぷらかす(無い場合はサラダオイル少量)	200個 約5握り 約3握り
厚目のビニール袋(新聞の半分位の大きさ)	1枚


作り方



1cm角に切った生のサツマイモとパン粉、天ぷらかすを全部ビニール袋に入れ、袋の口をしっかり握り、上下に15~20回振って下さい。



その上にエンドックスを加えて下さい。



もう一度15~20回上下に振ってでき上がり。

仕掛け方

- できた毒餌を手袋で1握りつつ、発泡スチロールの皿などに入れ、ネズミの出入りする物かげなどに5~6カ所置いて下さい。手袋は後でよく洗っておいて下さい。残った毒餌は2日目以降の補充用です。仕掛けた毒餌や補充用の毒餌をベットの食べられないよう充分注意して下さい。カビが生えたら面倒でももう一度作り直して下さい。
- 2日目、仕掛けた場所の中で、食べていない所の毒餌は片付け、食べた所の毒餌をまた元の1握り位にしておいて下さい。
- 5~6日続けて食べさせないと効果が現れませんので、餌が減らなくなるまで続けて下さい。



減ったら同じ量にして5~6日間



減らなくなるまで!



※中毒症状が現れた場合の対処:解毒剤としてビタミンK1注射が有効です。

■ ネズミの防除指標 (一例)

7日間に捕獲されたネズミの数

評価	ネズミ指数	ネズミの数
良い	0	0
少ない	1	1~10
中程度	2	11~25
多い	3	>25

ネズミ指数=7日間に12の罠に掛かったネズミの総数。

もし罠の数が少ないか多い場合には、以下の式に基づいて、7日以上もしくは7日未満の期間に捕えたネズミの数とする。

$$\text{全罠に掛かったネズミの総数} \div \text{機能していた罠の数} \div \text{日数} \times 12 \times 7$$

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



エンバイロサイエンスジャパン株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町 1-6-1 www.jp.envu.com

EnvuとEnvuのロゴはエンバイロサイエンスU.S.社またはその関連会社の商標です



お問い合わせ先